I'm not a bot

dvtd منع تخثر الدم في إرشادات

[illegible] يمكن أن تؤدي الخلطة الدموية في الوريد الكبير مثل خلطة في وريد الساق أو ما يسمى بتخثر الأوردة العميقة "AntiCoagulants" مضادات التخلط أو مضادات تخثر الدم [illegible] بعض اضطرابات الدم التي تؤثر على عملية تخلط الدم مثل أهبة التخثر الوراثي، الحصوات الأنفية، [illegible] (الثهاب الشغاف) ، صبق صمام في القلب أو تصبق الصمام الناجي. جراحة استبدال صمام القلب. عدوي داخل القلب (الثهاب الشغاف) ، صبق صمام في القلب أو تصبق الصمام الناجي. عادة يُوصف مضادات التخثر شيوعًا هو تخلط الأوردة العميقة [illegible] إصابة بخلطة دموية أي شخص لديه: سرعة ضربات القلب غير المنتظمة (الرجفان الأذيني) [illegible] ، وإذا كان لديك بالفعل خلطة دموية، والسبب الأكثر شيوعًا هو تخلط الأوردة العميقة [illegible] اختبار الدم هذا النسبة الطبيعية الدولية (PT) الخلطات، ومن أمثلة الأدوية المضادة للصفحات: الأسبرين كلوبيدوجريل (بلافيكس) ديبيردامول (بيرسينتين) تيكلوبيدين (تيكليد) أما مضادات التخثر فهي تعمل على منع تخلط الدم بزيادة الوقت الذي يستغرقه دمك للتخلط، وغالبًا يصف الأطباء مضادات التخثر للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم ببعض أشكال أمراض القلب، وتشمل مضادات التخثر الشائعة ما يلي: الوارفارين(كومادين، جانتوفين) إينوكساباريين(لوفينوكس) البيماريين وتشمل مضادات التخثر الأحدث من مخاطر أقل للنزيف ما يلي: دابيغاتران(برادكسا) أبيكسابان(إليكويس) ريفاروكسابان(زارلتو) سيرافب طبيث بعناية جرعة دواء مع الخلطات الخاص بك وقد يقوم الطبيب أحيانًا بإجراء اختبار البروثرومبين [illegible] إذا كنت حاملًا أو مرضعة فاحرص على عدم استخدام عقار الوارفارين [illegible] تاغو لاعتوازن. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، وفق جاي كنداريا، قدمت منحي الموافقة لتطبيق تاغو لاعتوازن، وهو جزء من مبادرة أوسع تهدف إلى تبسيط الوصول إلى العلاجات المنقذة للحياة. وتأتي هذه الخطوة بعد مراجعة أولية أجرتها الهيئة لبيانات سريرية وصيدلانية أظهرت أن الدواء يحافظ على مستويات مضادة للتخثر مماثلة لتلك التي تحققها الأدوية القائمة، مع تقليل ملحوظ في حالات النزيف الشديدة. وأكدت الهيئة أن الموافقة تستند إلى تقييم شامل يشمل جودة التصنيع والسلامة والفعالية، مع إلزام الشركة بإجراء دراسات ما بعد الطرح لرصد أي آثار جانبية نادرة على نطاق واسع. [illegible] مضادات التخثر والمكملات العشبية أو الغيتامينات : يمكن أن تتفاعل الأعشاب والغيتامينات مع الأدوية المضادة للتخثر، وتذكر أن الاستخدام المنسق للغيتامينات المتعددة مع جرعات منخفضة من فيتامين ك، وتجنب الغيتامينات التي تحتوي على جرعات عالية من فيتامين [illegible] HealthLine| NHS 12-08-2024 . من أن جميع مقدمي الرعاية الصحية الخاصين بك يعلمون بشأن تناولك للعقاقير المضادة لتخثر الدم. تحدث دائمًا إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك قبل تناولك أي أدوية أو مكملات جديدة: لأنها يمكن أن تؤثر على طريقة عمل مضادات تخلط الدم [illegible] مضادات التخثر الأخرى مثل الوارفارين و LMWH الذي يُستخدم عادةً في المستشفيات، فإن (UFH) في عملية التخثر من العمل كما ينبغي. وتشمل هذه الأدوية التي تأتي في هيئة أقراص أبيكسابان (إليكويس) وبتريكسابان (بيفيكس)، وإدوكسابان (ليكسيانا ،وسافايسا)، وريفاروكسابان (زارلتو). قد تعرف هذه الأدوية مثل دالتيبارين (فراجمين) أو إينوكساباريين (لوفينوكس)، وبالمقارنة مع الهيبارين العادي غير المجزأ Xia للتخلط مع استخدام الجسم للبروميين وهو إنزيم رئيسي يساعد على تخلط الدم على الرغم من حقنها عادة تحت الجلد، كما يمكن تناولها في هيئة أقراص مثل دابيجاتران (براداكسا). منبطات العامل [illegible] لن تتبع آثاره عن كثب كما هو الحال مع مضادات التخثر الأخرى مثل الوارفارين و LMWH الذي يُستخدم عادةً في المستشفيات، فإن (UFH) في عملية التخثر من العمل كما ينبغي. وتشمل هذه الأدوية التي تأتي في هيئة أقراص أبيكسابان (إليكويس) وبتريكسابان (بيفيكس)، وإدوكسابان (ليكسيانا ،وسافايسا)، وريفاروكسابان (زارلتو). قد تعرف هذه الأدوية مثل دالتيبارين (فراجمين) أو إينوكساباريين (لوفينوكس)، وبالمقارنة مع الهيبارين العادي غير المجزأ Xia للتخلط مع استخدام الجسم للبروميين وهو إنزيم رئيسي يساعد على تخلط الدم على الرغم من حقنها عادة تحت الجلد، كما يمكن تناولها في هيئة أقراص مثل دابيجاتران (براداكسا). منبطات العامل [illegible] الأمعاء الدقيقة، وتشمل مضادات التخثر الشائعة ما يلي: الوارفارين(كومادين، جانتوفين) إينوكساباريين(لوفينوكس) البيماريين وتشمل مضادات التخثر الأحدث من مخاطر أقل للنزيف ما يلي: دابيغاتران(برادكسا) أبيكسابان(إليكويس) ريفاروكسابان(زارلتو) سيرافب طبيث بعناية جرعة دواء مع الخلطات الخاص بك وقد يقوم الطبيب أحيانًا بإجراء اختبار البروثرومبين [illegible] الدم. وتتضمن ما يلي: إذا كان لديك أي علاج طبي فيجب عليك دائمًا إخبار أخصائي الرعاية الصحية الذي يعتني بك أنك تتناول أحد مضادات التخثر. فمن المهم أن يعلموا أنك قد تستغرق وقتًا أطول لوقف النزيف. إذا كنت تتناول الوارفارين [illegible] warfarin الدم، وتتضمن ما يلي: إذا كان لديك أي علاج طبي فيجب عليك دائمًا إخبار أخصائي الرعاية الصحية الذي يعتني بك أنك تتناول أحد مضادات التخثر. فمن المهم أن يعلموا أنك قد تستغرق وقتًا أطول لوقف النزيف. إذا كنت تتناول الوارفارين [illegible] تأكد من الاتصال بعيادة مع warfarin الدم، وتتضمن ما يلي: إذا كان لديك أي علاج طبي فيجب عليك دائمًا إخبار أخصائي الرعاية الصحية الذي يعتني بك أنك تتناول أحد مضادات التخثر. فمن المهم أن يعلموا أنك قد تستغرق وقتًا أطول لوقف النزيف. إذا كنت تتناول الوارفارين [illegible] المضادات الحيوية. [illegible] الغيتامينات التي تحتوي على جرعات عالية من فيتامين [illegible] تخلط الأوردة العميقة [illegible] مضادات التخثر العمومية [illegible] الهيبارين، غالبًا ما يتم إعطاؤه عن طريق الوريد أو عن طريق الحقن، ويعمل الهيبارين بسرعة على تسييل الدم. الوارفارين، يتطلب هذا الدواء عن طريق الفم إجراء اختبارات دم منتظمة لمراقبة تأثيره والتأكد من الجرعة الصحيحة. مضادات التخثر العمومية [illegible] مضادات التخثر الأخرى مثل الوارفارين و LMWH الذي يُستخدم عادةً في المستشفيات، فإن (UFH) في عملية التخثر من العمل كما ينبغي. وتشمل هذه الأدوية التي تأتي في هيئة أقراص أبيكسابان (إليكويس) وبتريكسابان (بيفيكس)، وإدوكسابان (ليكسيانا ،وسافايسا)، وريفاروكسابان (زارلتو). قد تعرف هذه الأدوية مثل دالتيبارين (فراجمين) أو إينوكساباريين (لوفينوكس)، وبالمقارنة مع الهيبارين العادي غير المجزأ Xia للتخلط مع استخدام الجسم للبروميين وهو إنزيم رئيسي يساعد على تخلط الدم على الرغم من حقنها عادة تحت الجلد، كما يمكن تناولها في هيئة أقراص مثل دابيجاتران (براداكسا). منبطات العامل [illegible] الأمعاء الدقيقة، وتشمل مضادات التخثر الشائعة ما يلي: الوارفارين(كومادين، جانتوفين) إينوكساباريين(لوفينوكس) البيماريين وتشمل مضادات التخثر الأحدث من مخاطر أقل للنزيف ما يلي: دابيغاتران(برادكسا) أبيكسابان(إليكويس) ريفاروكسابان(زارلتو) سيرافب طبيث بعناية جرعة دواء مع الخلطات الخاص بك وقد يقوم الطبيب أحيانًا بإجراء اختبار البروثرومبين [illegible] الدم. وتتضمن ما يلي: إذا كان لديك أي علاج طبي فيجب عليك دائمًا إخبار أخصائي الرعاية الصحية الذي يعتني بك أنك تتناول أحد مضادات التخثر. فمن المهم أن يعلموا أنك قد تستغرق وقتًا أطول لوقف النزيف. إذا كنت تتناول الوارفارين [illegible] الأسبرين، فإن الأسبرين يعمل على منع تخثر الصفائح الدموية، وهي خلايا صغيرة في الدم تساعد على تخثر الدم. يُوصف الأسبرين عادةً للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو الأوعية الدموية، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، وقد يُوصف أيضًا للأشخاص الذين يعانون من عوامل خطر معينة لهذه الأمراض. [illegible] الأدوية المضادة للصفائح: الأسبرين كلوبيدوجريل (بلافيكس) ديبيردامول (بيرسينتين) تيكلوبيدين (تيكليد) أما مضادات التخثر فهي تعمل على منع تخثر الدم بزيادة الوقت الذي يستغرقه دمك للتخثر، وغالبًا يصف الأطباء مضادات التخثر للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم ببعض أشكال أمراض القلب