

Hướng dẫn phái nữ lựa chọn kháng sinh ngừa thai được bảo vệ và phù hợp

Lựa chọn thuốc tránh thai hợp lý có khả năng là một thách thức với bạn gái. Phần lớn phái nữ đều chưa hiểu hết về kháng sinh tránh thai và cần thiết sử dụng kiểu nào được bảo vệ, phù hợp.

Dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu những ưu và điểm hạn chế của các loại thuốc kháng sinh ngừa thai không giống nhau để có những quyết định khoa học giúp bản thân.



Tính không giống nhau của những kiểu kháng sinh ngừa thai

Có hai dạng thuốc kháng sinh ngừa thai chính:

Kháng sinh ngừa thai kết hợp

Kiểu kháng sinh này có đựng cả estrogen và progestin. Có không ít dạng kháng sinh kết hợp để bạn chọn lựa, tùy vào tình trạng thường xuyên bạn muốn hành kinh nguyệt và liều số lượng hormone khoa học nhất đối với bạn.

Những mini pill

Kiểu kháng sinh này chỉ chứa progestin. Những minipill không mang lại nhiều sự chọn lựa ví dụ thuốc kháng sinh kết hợp. Trong mỗi gói thuốc, toàn bộ những viên kháng sinh đều đựng cùng một lượng progestin và đa số những viên thuốc đều vận động. Liều progestin trong 1 minipill không cao hơn liều progestin trong bất kỳ viên thuốc kháng sinh phối hợp nào.

Thuốc ngừa thai kết hợp có nhiều lần loại thuốc hoạt đặc điểm và không vận động, dựa vào tần suất bạn muốn có kinh:

Thông luôn

Gói thông luôn hay chứa 21 viên thuốc hoạt động và bảy viên thuốc kháng sinh không vận động, hoặc 24 viên thuốc hoạt động và bốn viên thuốc không vận động.

Liều rất hay hay chu kỳ cải thiện

Những gói này luôn chứa 84 viên kháng sinh hoạt động và bảy viên kháng sinh không vận động. Những ngày kinh nguyệt chỉ bắt gặp bốn lần một năm, trong thời gian bạn lấy kháng sinh không hoạt động.

Thuốc kháng sinh tránh thai kết hợp cũng được phân dạng theo liều liệu số lượng hormone trong thuốc kháng sinh hoạt động giữ nguyên hay thể đổi:

- Liều đơn: trong dạng thuốc kháng sinh tránh thai phối hợp này, mỗi viên thuốc hoạt tính có đựng cùng một số lượng estrogen và progestin.
- Đa liều: trong kiểu thuốc kháng sinh ngừa thai kết hợp này, số lượng hormone trong thuốc kháng sinh vận động không giống nhau.

Phần lớn các dạng thuốc tránh thai kết hợp có cất 10 đến 35 microgam ethinyl estradiol, đây là một dạng estrogen. Phụ nữ mẫn cảm với hormone có thể cần thiết dùng kiểu 1 viên chứa một liều estrogen.

Cơ chế vận động của các dạng kháng sinh ngừa thai

Thuốc ngừa thai phối hợp phòng ngừa buồng trứng của bạn phát hành trứng. Chúng cũng làm chậm tiến trình của trứng qua ống dẫn trứng, thực

hành dày hoạt chất nhạy cổ tử cung và thực hiện mỏng niêm mạc tử cung (nội mạc tử cung). Toàn bộ những điều đó này giúp duy trì giúp tinh trùng không tham gia trứng.

[Địa chỉ phá thai an toàn tại Hà Nội](#)

[Pha thai](#)

[Phá thai hết bao nhiêu tiền](#)

[Địa chỉ phá thai an toàn Hà Nội](#)

[Phong kham pha thai](#)

[Uống thuốc phá thai có ảnh hưởng gì không](#)

[Giá phá thai](#)

[Phá thai an toàn ở đâu](#)

[Chi phí pha thai an toàn](#)

[Thời điểm phá thai tốt nhất](#)

[Cách phá thai](#)

[Mua thuốc phá thai](#)

[Phá thai ở đâu an toàn](#)

[Chi phí phá thai an toàn](#)

[Chi phí phá thai](#)

[Phòng khám phá thai về trong ngày](#)

[Tư vấn phá thai ở Bắc Ninh](#)

Những minipill tuân thủ chậm tiến trình của trứng qua ống dẫn trứng, thực hiện dày chất nhạy cổ tử cung và tuân thủ sạch nội mạc tử cung - Tất cả đều cho ngăn tinh trùng đến trứng. Các minipill thỉnh thoảng cũng chống lại sự rụng trứng.

Có bắt buộc toàn bộ những loại thuốc kháng sinh tránh thai hợp lý giúp hầu như phần

Lớn người?

Bác sĩ sẽ hỏi về tiền sử căn bệnh và bất kỳ dạng thuốc nào đang dùng để xác định loại kháng sinh tránh thai nào hợp lý. Chuyên gia có thể không chú ý dùng kháng sinh tránh thai kết hợp ví như bạn:

- Vừa mới sinh con
- Trầm trọng hơn 35 tuổi và hút thuốc
- Tự chủ cao huyết áp
- Gặp phải biến đổi đông máu hay có tiền sử máu khối mạch máu sâu hoặc tắc mạch phổi
- Có tiền sử ung thư vú
- Có tiền sử đột quỵ hay căn bệnh tim
- Có những biến chứng sự liên quan tới căn bệnh tiểu đường
- Nhiễm phải gan hay túi mật
- Có tiền sử đau đón nửa đầu
- Có ra máu tử cung không rõ tác nhân

Bác sĩ của bạn có nguy cơ không khuyên sử dụng minipill nếu bạn:

- Mặc phải ung thư vú
- Có một số căn bệnh về gan
- Có chảy máu tử cung không rõ tác nhân
- Dùng thuốc tránh co giật hoặc kháng sinh ngăn chặn lao.

Những ưu và điểm hạn chế của kháng sinh phối hợp

Ưu thế

- Dễ dàng đảo ngược biện pháp ngừa thai nếu bạn hy vọng mang thai.
- Giảm sút hội chứng tiền kinh nguyệt (pms).
- Chuột rút kinh nguyệt ít trầm trọng (đau bụng kinh).
- Gia tăng mụn nhọt trứng cá.
- Thời gian ngắn hơn, nhẹ hơn và dễ dự đoán hơn, hoặc ít hơn hoặc không có lúc.
- Giảm ra máu nghiêm trọng (rong kinh) và thiếu máu sự liên quan.
- Suy nhược biểu hiện lạc nội mạc tử cung.
- Giảm khả năng ung thư buồng trứng, nội mạc tử cung và đại trực tràng.

- Có khả năng tác động tích cực tới mật độ xương cải thiện sự tiến triển tóc không yêu cầu (hirsutism) tạo ra vì hội chứng buồng trứng đa nang.

Điểm hạn chế

- Phá kháng sinh hoặc dùng muện có khả năng làm suy nhược tác dụng tốt.
- Không bảo vệ chống lại những bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục, gồm có cả hiv.
- Nâng cao nguy cơ cholesterol cao, đau đởn tim và đột quy.
- Nâng cao khả năng đông huyết, đặc biệt đối với đối tượng hút thuốc kháng sinh và chị em nữ giới vừa rồi 35 tuổi, có nguy cơ đông máu cao hơn 1 chút so với kháng sinh chứa liều estrogen cao hơn.
- Tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung và ung thư vú giúp các chị em hiện đang sử dụng thuốc tránh thai phối hợp, nhưng khả năng này dường đó là giảm dần tới mức bình hay thời điểm bạn giới hạn áp dụng thuốc.
- Những công dụng phụ ví dụ chảy máu bất luôn, đầy tương đối, đau đởn vú, mót nôn, trầm cảm, tăng cân và đau đầu.

Các ưu và nhược điểm của minipill

Ưu điểm

- Dễ dàng đảo ngược giải pháp ngừa thai trường hợp bạn hy vọng mang thai.
- Có nguy cơ được thực hiện liền cả khi bạn có một vài thắc mắc sức khỏe thực hiện nâng cao khả năng sử dụng kháng sinh phối hợp, thí dụ hòn máu đông, đau đởn nửa đầu, cao huyết áp hay nguy cơ mắc phải tim cao.
- Ít có xác suất hơn thuốc kháng sinh kết hợp để can thiệp tới vấn đề giúp con bú.

Nhược điểm

- Nên dùng cùng một khi mỗi ngày - Giả dụ bạn bỏ qua 1 viên thuốc kháng sinh hay uống thuốc muện hơn 3 giờ, bạn cần thiết dùng một hình thức tự chủ sinh sản dự phòng trong ít nhất hai ngày.
- Không bảo vệ ngăn ngừa các căn bệnh lây truyền qua đường tình dục, gồm có cả hiv.

- Các tác dụng phụ đó là ra máu kinh nguyệt bị rối loạn, hòn nang buồng trứng, giảm kích thích, đau đầu, đau vú, nổi mụn, tăng cân, trầm cảm và hirsutism.
- Nâng cao nhẹ khả năng rằng giả dụ mang thai, trứng được thụ thai sẽ cấy bên cạnh tử cung (thai bên cạnh tử cung).

Có nguy cơ kể, ngừa thai bằng thuốc kháng sinh là biện pháp ngừa thai tác dụng tốt. Nhưng mà, chị em phụ nữ nên nắm rõ ưu và nhược điểm cũng như là trường hợp nào cần thiết sử dụng loại nào để được bảo vệ, hiệu quả nhất.